

TD n°3 Théorie de la mesure

Polisano Kévin

12 novembre 2010

Exercice 6

1.

$$\forall t \in \mathbb{R}, \int_0^1 \sqrt{f(x) + t^2} dx \leq \int_0^1 \sqrt{\|f\|_\infty + t^2} dx \leq \sqrt{\|f\|_\infty + t^2} < +\infty$$

Donc F est définie sur tout \mathbb{R} . De plus sur tout compact $[a, b]$: $\sqrt{f(x) + t^2} \leq \sqrt{\|f\|_\infty + b}$ intégrable.

On en déduit que F est continue sur \mathbb{R} .

2. Calculons le taux d'accroissement suivant en utilisant la quantité conjuguée :

$$\frac{F(t) - F(0)}{t - 0} = \frac{1}{t} \int_0^1 (\sqrt{f(x) + t^2} - \sqrt{f(x)}) dx = \frac{1}{t} \int_0^1 \frac{t^2}{\sqrt{f(x) + t^2} + \sqrt{f(x)}} dx$$

On fait tendre $t \rightarrow 0$ par valeurs positives, on pose $t = \frac{1}{n}$:

$$\frac{F(\frac{1}{n}) - F(0)}{\frac{1}{n}} = \int_0^1 \frac{\frac{1}{n}}{\sqrt{f(x) + \frac{1}{n^2}} + \sqrt{f(x)}} dx$$

On note $f_n(x)$ l'intégrande, majorée par 1 et qui tend simplement vers 0.

Le théorème de convergence dominée montre que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{F(\frac{1}{n}) - F(0)}{\frac{1}{n}} = 0$$

Par unicité de la limite il vient :

$$\boxed{\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{F(t) - F(0)}{t} = 0}$$

On en conclut que F est dérivable à droite en 0 de dérivée nulle.

Exercice 7

$$f(t) = \int_0^{+\infty} e^{-tx} \frac{\sin x}{x} dx$$

1. $\forall x \in [0, +\infty[$, $t \mapsto e^{-tx} \frac{\sin x}{x}$ est dérivable sur $[0, +\infty[$ de dérivée :

$$t \mapsto -e^{-tx} \sin x = -\Im(e^{-tx} e^{ix}) = -\Im(e^{x(i-t)})$$

De plus $\forall t \in [a, b] \subset]0, +\infty[$, $\forall x \in [0, +\infty[$, $e^{-tx} \sin x \leq e^{-ax}$ et $x \mapsto e^{-ax}$ intégrable sur $[0, +\infty[$.

D'où f dérivable sur $]0, +\infty[$ et :

$$f'(t) = -\Im \left(\int_0^{+\infty} e^{x(i-t)} dt \right) = -\Im \left(\left[\frac{e^{x(i-t)}}{i-t} \right]_0^{+\infty} \right) = \Im \left(\frac{1}{i-t} \right) = \Im \left(\frac{-i-t}{|i-t|^2} \right)$$

$$\boxed{\forall t \in]0, +\infty[, f'(t) = -\frac{1}{1+t^2}}$$

remarque : $|e^{x(i-t)}| = e^{-tx} \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow +\infty$ donc $e^{x(i-t)} \rightarrow 0$.

Posons $f_n(x) = e^{-nx} \frac{\sin x}{x}$. On a :

$$|f_n(x)| \leq e^{-nx} \leq e^{-x}$$

avec $x \mapsto e^{-x}$ intégrable sur $[0, +\infty[$ et (f_n) converge simplement vers la fonction nulle quand $n \rightarrow +\infty$.

D'après le théorème de convergence dominée on a donc :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} f_n(x) dx = \int_0^{+\infty} \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) \right) dx = 0$$

Par unicité de la limite il vient :

$$\boxed{\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = 0}$$

2. En intégrant on en déduit que : $\forall t > 0, f(t) = -\arctan(t) + C$ et comme : $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = 0$:

$$\boxed{\forall t > 0, f(t) = \frac{\pi}{2} - \arctan(t)}$$

3. La fonction f étant continue sur $[0, +\infty[$ on obtient :

$$\boxed{f(0) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}}$$